

# Verzeichniß der Mononychiden

von

Dr. C. Stål in Stockholm.

---

**A.** — Hemelytris membrana distincta instructis, late valvantibus; thorace postice ante scutellum distincte sinuato, angulis posticis rotundatis vel obtusis.

a. Mesosterno posterius et metasterno elevatis, parte elevata plus minus acuminata; margine costali hemelytrorum haud sinuato. — *Mononyx* Lap.

b. Mesosterno posterius et metasterno elevatis, parte elevata apice obtusata et dilatata; margine costali hemelytrorum ante medium nonnihil sinuato, ante sinum leviter ampliato. — *Phintius* Stål.

**B.** — Hemelytris membraua nulla vel rudimentaria instructis, vix vel anguste valvantibus, mesosterni et metasterni parte elevata acuminata.

a. Fronte plana, marginibus lateralibus plus minus distincte bimaculatis; hemelytris ante medium distincte dilatatis. — *Matiinus* Stål.

b. Fronte subconvexa, disco trituberculata; scutello parvo; hemelytris basi leviter dilatatis; trochanteribus anticis apice productis. — *Peltopterus* Guér.

## *Mononyx* Lap.

Essai d'une class. des Hém. p. 16.

1. *M. raptorius* Fabr., *Naucoris raptoria* Fabr. Syst. Rhyng. p. 111. 6. (1803.)

America meridionalis.

2. *M. bipunctatus* Stål Öfv. Vet. Ak. Förh. 1851. p. 239. 2.; *Mononyx raptorius* Burm. Handb. d. Entom. II. 1. p. 201. 1. (1835); Am. et Serv. Hist. des Hém. p. 426. 1. (1834); H.-Sch. Wanz. Ins. IX. p. 27. Fig. 895. (1853.)

Rio Janeiro.

3. *M. raninus* H.-Sch. Wanz. Ins. IX. p. 28. Fig. 896. (1853.)
4. *M. fusco-conspersus* Stål Bidr. Rio Jan. Hem. I. p. 82. 2.  
Rio Janeiro.
5. *M. fuscipes* Guér. Rev. Zool. 1843. p. 114; *Mononyx badius* H.-Sch. Wanz. Ins. IX. p. 27. Fig. 894. (1853); *Mononyx obscurus* Stål Öfv. Vet. Ak. Förh. 1854. p. 239. 3.  
Mexico, Columbia.

6. *M. laticollis* Guér. Rev. Zool. 1843. p. 114.

Haec species non solum ad Mononychidem, genus americanum, certissime peclinat, sed *M. amplicollis* maxime est affinis, quare patriam Novam Guineam pro Nova Granada a Guerin incorrecte indicatam esse puto. Exemplum typicum examinavi.

Ad descriptionem Guerinii adde: corpore supra minute densissimeque granulato; hemelytris tuberculis quattuor (1. 2. 1.) discoidalibus. parvis, parum elevatis, fuscis, asperis instructis; capitil marginibus lateralibus obtuse bidentatis; thorace antice ruga longitudinali media et postice, in sulco transverso, tuberculo parvo instructo.

7. *M. amplicollis* Stål. Dense granulatus, subferrugineo-terreus, subtus cum pedibus posterioribus, femoribus anticis superne, tibiis tarsisque anticis nigricans vel fuscus; lateribus dilatatis prostethii maculisque duabus mesostethii et metastethii, interdum etiam maculis marginalibus ventris flavo-ferrugineis. ♂, ♀. — Long. 12—14, Lat. thor. 7—8½ mill.

Nova Granada, Antioquia. Dom. Nisser. (Mus. Holm.)

*Mononyx amplicollis* Stål Öfv. Vet. Ak. Förh. 1854. p. 239. 1.

*M. laticollis* maxime affinis et similis, thorace paullo minus ampliato, hemelytris tuberculis parvis destitutis praesertim differt. Caput prope apicem tuberculis duobus instructum. Thorax disco transverso modice elevato, sulcis terminato, sulco postico utrimque rugis duabus interrupto, hemelytris nonnihil latior, fere octangularis, basi distincte sinuatus, marginibus lateralibus parallelis, angulis anticis leviter productis. Scutellum leviter elevatum, biimpressum, in exemplis pallidioribus maculis duabus fuscis notatum. Hemelytra obsolete fusco-conspersa.

8. *M. stygicus* Say; *Naucoris stygica* Say New Harm. Indiana p. 808. 2. (1831); Compl. writ. ed. LeConte I. p. 364. (1859.)

Georgia Americae.

*Phintius* Stål.

Öfv. Vet. Ak. Förh. 1861. p. 201.

1. *P. grandicollis* Germar; *Mononyx grandicollis*  
Germ. Rev. Ent. V. p. 122. 4. (1837.)  
Caput bonae spei.

2. *P. limigenus* Stål Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 46. 1.  
Caffraria.

3. *P. sordidus* Herr.-Sch.; *Mononyx sordidus* H.-Sch.  
Wanz. Ins. IX. p. 26 Fig. 893. (1853.)  
Sierra Leona.

4. *P. rotundicollis* Signor.; *Mononyx rotundicollis*  
Sign. in Thoms. Arch. Ent. II. p. 329. 628. (1858.)  
Gabon.

*Matinus* Stål.

Öfv. Vet. Ak. Förh. 1861. p. 201.

1. *M. alaticollis* Stål; *Mononyx alaticollis* Stål Öfv.  
Vet. Ak. Förh. 1854. p. 239. 4.  
Nova Hollandia.

2. *M. adspersus* Stål. Latissime ovalis, subrotundatus, supra cum lateribus prostethii albidos, nigro-conspersus; pedibus sordide albidis vel pallide sordide stramineis, coxis, trochanteribus, femoribus anticus extus, femoribus posterioribus, apice excepto, pectore ventreque nigris; maculis pectoris, maculis marginalibus et lateralibus ventris, interdum etiam discoidalibus in series dispositis sordide albidis. ♂, ♀. — Long. 5—6, Lat.  $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$  mill.

Australia occidentalis. (Mus. Holm.)

Supra alntacens, capite discoque thoracis minute densissimeque granulatis. Tuberculi marginales capitis distincti. Thorax medio hemelytrorum aequilatus, basi ante scutellum obsolete sinuatus, marginibus lateralibus totis rotundatis, angulis posticis distinctis, apice rotundatis. Tegmina ante medium dilatata, sed a medio basin versus nonnihil angustata.

Variat disco thoracis fusco.

3. *M. suberosus* Er.; *Mononyx suberosus* Er. Arch. für Naturgesch. VIII. 1. p. 285. 276. (1842.)  
Tasmania.

*Peltopterus* Guér.

Rev. Zool. 1843. p. 113; *Scylaecus* Stål Öfv. Vet. Ak. Förh. 1861.  
p. 201.

1. *P. rugosus* Desj.; *Naucoris rugosa* Desj. Ann. Ent. VI. p. 239. (1837); Serv. Ann. Ent. VI. p. 243. (1837); Westw. Mod. class. II. p. 464. (1840); *Peltopterus rugosus* Guér. Rev. Zool. 1843. p. 113.

Isle de France.

2. *P. macrothorax* Montr.; *Galgulus macrothorax* Montr. Ann. Scienc. phys. et nat. Sér. 2. VII. 1. p. 110. (1855.)  
Insula Woodlark.

---